

FICHA TÉCNICA

Rodenticida anticoagulante
Cebo líquido
Aplicación urbana

RSCO-URB-RODE-511-304-004-0.005

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente Activo:	P/P
Bromadiolona: 3-[3-(4'-Bromo[1,1'-bifenil]-4-il)-3-hidroxi-1-fenil-propil]-4-hidroxi-2H-1-benzopirán-2-ona. (Equivalente a 0.05 g de i.a./kg)	No menos de0.005%
Ingredientes Inertes:	
Atrayente, colorante, aglutinante, vehículo y saborizante	No más de99.995%
	Total:100.00%

**PUEDE SER NOCIVO
EN CASO DE
INGESTIÓN**

PRECAUCIÓN

**“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR
APLICADORES DE PLAGUICIDAS
AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE
SALUD”**

**“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR
EL PRODUCTO”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y aplicación del producto (guantes de látex).

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

“No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto”.

“No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes”.

“Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos”.

“Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos”.

“No aplique el producto sin el equipo de protección adecuado”.

“No almacenar en casas habitación”.

“Los menores de 18 años no deben manejar este producto”.

“Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”.

“No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos”.

INSTRUCCIONES DE USO

ERRADIC® CEBO LÍQUIDO es útil para el control de roedores como:

MODO DE EMPLEO:

PLAGA	GRADO DE INFESTACIÓN	CANTIDAD DE CEBO POR PUNTO DE CEBADO	OBSERVACIONES
RATAS Rata de Alcantarilla <i>Rattus norvegicus</i> Rata de los tejados <i>Rattus rattus</i>	LIGERA A MODERADA	50 a 100 ml	Coloque la cantidad del cebo por punto de cebado o cada 5 a 10 metros
	ALTA	200 a 250 ml	
RATONES Ratón Doméstico <i>Mus musculus</i>	LIGERA A ALTA	25 a 50 ml	Colocar la cantidad del cebo cerca de los nidos o madrigueras, o cada 3 a 4 metros de distancia.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Este rodenticida no requiere de ninguna preparación; viene listo para usarse.

APLICACIÓN:

Se recomienda colocar **ERRADIC® CEBO LÍQUIDO** dentro de bebederos de plástico profesionales cerca de lugares frecuentados por los roedores como madrigueras, agujeros, grietas, rincones y lugares poco accesibles, en el perímetro de las instalaciones o en cualquier sitio donde se hayan observado roedores o rastros de ellos.

También puede ser utilizado sobre pan o galletas, siempre y cuando se coloquen dentro de cebaderos profesionales. Maneje el producto utilizando guantes para evitar contaminar el cebo.

Reponga el cebo consumido. Repita el procedimiento hasta que disminuya el consumo o disminuyan los daños. En caso de reinfestación repita el tratamiento. El uso de cebaderos herméticos profesionales incrementa la seguridad del producto y evita el desperdicio.

TIEMPO DE REENTRADA A LUGARES TRATADOS: Por su formulación es posible reingresar a las áreas inmediatamente.

CONTRAINDICACIONES: No se mezcle con el uso de insecticidas y no se almacene cerca de los mismos.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”.

PRIMEROS AUXILIOS:

Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávese la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos. Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito administrando agua salada tibia (una cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia), repita la operación hasta que el vómito salga claro. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. Llame inmediatamente al médico.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

GRUPO QUÍMICO: Hidroxicumarinas

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

La ingestión del producto puede causar dolor epigástrico, náusea, vómito, salivación, cansancio, vértigo y días después hemorragias internas. Por inhalación puede causar irritación de vías respiratorias y/o hemorragia nasal. Puede absorberse por piel y causar enrojecimiento, picor, sensación de dolor. En los ojos puede causar irritación temporal.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO

ESPECÍFICO: El tratamiento debe ser sintomático. Administrar vitamina K1 (Fitonadiona). Dosis si el paciente está sangrando: 10 mg I.V. en adultos y 5 mg

I.V. en niños. Si no está sangrando: adultos 15–25 mg vía oral o 5–10 mg I.M. en niños 5-10 mg vía oral o 1-5 mg I.M. Repetir si es necesario. Debe mantenerse bajo supervisión médica hasta que los niveles de protrombina queden normales y la hemorragia haya cesado.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

“Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos”.

“Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT”.

“El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)”.

“En caso de caída accidental del producto, se deberá usar equipo de protección personal, recuperar el producto que sea útil hasta donde sea posible, y lo demás recogerlo en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano”.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: Este producto es ALTAMENTE tóxico para animales terrestres de sangre caliente (mamíferos y aves).

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR:

QUIMIX, S.A. DE C.V.

AV. CENTRAL 206, 2DO PISO, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS,
DEL. ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01180,
MÉXICO D.F.

TEL. (55) 52-78-46-80

HECHO EN MÉXICO

07.01.15 TR