



FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial
FAENA CLÁSICO

Ingrediente activo y composición

Sal de potasio de glifosato - 363 g/L

Categoría

Herbicida y desecante agrícola

Modo de acción

Sistémico. Postemergencia.

Tipo de formulación

Concentrado soluble

Registro Sanitario

RSCO-HEDE-0230-346-375-036

Logotipo



Categoría toxicológica

5 - PRECAUCIÓN

Símbolo



Palabra de advertencia

Nocivo si se inhala

Cultivos y usos autorizados

CULTIVO	MALEZA	DOSIS (L/ha)
Limón, naranjo, mandarino, toronja, tangerina	Hoja angosta: Zácula peludo (<i>Rottboellia exaltata</i>)	2.0 – 3.0
	Hoja ancha: Quelite (<i>Amaranthus spinosus</i>), Barba de viejo (<i>Boerhaavia erecta</i>), Hierba alfombra (<i>Mollugo verticillata</i>), Golondrina (<i>Euphorbia hirta</i>)	3.0 – 4.0
Maíz, sorgo (SL)	Hoja angosta: Zácula de año (<i>Panicum fasciculatum</i>), Zácula chino (<i>Dactyloctenium aegyptium</i>)	3.0 – 4.0
	Hoja ancha: Verdolaga de puerco (<i>Trianthema portulacastrum</i>)	3.0 – 4.0
Sorgo ¹ (7)	Como desecante en el cultivo	2.0 – 3.0
	Hoja ancha: Quelite (<i>Amaranthus palmeri</i>), Amargosa (<i>Parthenium hysterophorus</i>)	4.0 – 6.0
Algodonero genéticamente modificado tolerante a glifosato (SL)	Correhuela: (<i>Convolvulus arvensis</i>) ²	5.0 – 6.0
	Hoja angosta: Zácula de agua (<i>Echinochloa colona</i>)	2.0 – 4.0
Maíz genéticamente modificado tolerante a glifosato (SL) LMR tomado del CODEX Alimentarius. (Realizar aplicación total en el maíz tolerante a glifosato en post-emergencia a la maleza y al cultivo; volumen de aplicación 270-370 L de agua/ha)	Hoja ancha: Malva (<i>Anoda pentaschista</i>), Meloncillo (<i>Cucumis melo</i>), Guachapore (<i>Xanthium strumarium</i>)	2.0 – 4.0
	Hoja angosta: Zácula cola de zorra (<i>Leptochloa filiformis</i>)	4.0 – 6.0
Soya genéticamente modificada tolerante a glifosato (SL). LMR tomado del CODEX Alimentarius. (Realizar aplicación total en el soya tolerante a glifosato en post-emergencia al cultivo y maleza; volumen de aplicación 200 L/ha)		

() Intervalo de seguridad = días que deben transcurrir entre aplicación y cosecha

SL = Sin límite

Tiempo de reentrada a la zona tratada = 4 horas

Indicaciones especiales

(1) USO COMO DESECANTE EN EL CULTIVO DE SORGO Realizar una aplicación total cuando se haya completado el llenado del grano y éste tenga un contenido de humedad promedio entre 28 y 30% en madurez fisiológica y se observe la capa negra del grano. No aplicar en estado lechoso-masoso o más temprano. Calibrar el equipo de aplicación para asperjar un volumen de 200 L/ha a una presión de 30 lb/pulg² utilizando boquillas de abanico palno normal 11002VS, 11003 VS o similares.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO